

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Anatomie du tronc cérébral

Dr TAIBI.A

A-INTRODUCTION

- Le bulbe, la protubérance et le mésencéphale forment ensemble une tige *le tronc cérébral*, qui prolonge la moelle et paraît supporter le cerveau.
Sur le tronc cérébral se branche, en arrière, le cervelet.

suite

- C'est le segment du névraxe qui est placé au-dessus de la moelle, sous le cerveau et en avant du cervelet, au centre de la fosse crânienne postérieure.
- Le tronc cérébral est une portion dilatée du névraxe.
- Il présente à décrire 3 parties qui sont, de bas en haut :
 - a) - la moelle allongée (bulbe rachidien)
 - b) - le pont (protubérance annulaire)
 - c) - le mésencéphale (pédoncles cérébraux)


B –configuration externe

1-le bulbe rachidien

- Le *bulbe* présente, en avant, le sillon médian antérieur et les pyramides antérieures.
- Celles-ci sont bordées en dehors par le sillon collatéral antérieur d'où s'échappe, en haut, le nerf grand hypoglosse (XII).
- L'*olive bulbaire* fait saillie en arrière des racines du *grand hypoglosse*, sur la face latérale du bulbe.
- Cette face est limitée en arrière par le sillon collatéral postérieur d'où se détachent, de bas en haut, les racines du *spinal (XI)bulbaire*, du *pneumogastrique (X)* et du *glosso-pharyngien (IX)*.


Vue anterieure

1. chiasma optique
2. tige pituitaire
3. corps mammillaires
4. pédoncule cérébrale
5. III - nerf oculomoteur
6. IV - nerf trochléaire
7. protubérance annulaire
8. fosse inter-pédonculaire
9. sillon ponto-mésencéphalique (ponto-pédonculaire)
10. V - nerf trijumeau
11. gouttière médiane de la protubérance (sillon basilaire)
12. sillon bulbo-protubérantiel
13. VI - nerf abducens
14. VII - nerf facial
15. VIIbis - nerf intermédiaire de Wrisberg
16. VIII - nerf cochléo-vestibulaire
17. bulbe
18. pyramide bulbaire
19. olive bulbaire
20. fissure médiane ventrale (sillon médian antérieur)
21. fissure latérale ventrale (sillon collatéral antérieur pré-olivaire)
22. IX - nerf glosso-pharyngien
23. X - nerf vague
24. XI - nerf spinal
25. XII - nerf grand hypoglosse



Face laterale

1. chiasma optique
2. colliculus supérieur
3. colliculus inférieur
4. corps géniculé latéral
5. corps géniculé médial
6. pédoncule cérébral
7. III - nerf oculomoteur
8. IV - nerf pathétique
9. sillon ponto-mésencéphalique
10. pédoncule cérébelleux supérieur
11. pédoncule cérébelleux moyen
12. pédoncule cérébelleux inférieur
13. cordons des pédoncules cérébelleux moyens
(stries horizontales de la protubérance)
14. V - nerf trijumeau
15. protubérance annulaire
16. sillon bulbo-protubérantielle
17. sillon latéral ventral
18. sillon latéral dorsal
19. VIII - nerf cochléo-vestibulaire
20. VII' - nerf intermédiaire de Wrisberg
21. VII - nerf facial
22. VI - nerf abducens
23. IX - nerf glosso-pharyngien
24. X - nerf vague
25. XI - nerf spinal
26. XII - nerf grand hypoglosse
27. olive bulbaire
28. bulbe



Face postérieure du bulbe

- La face postérieure du bulbe a au-dessous du 4^{ème} ventricule, la même configuration que la moelle.
- A la hauteur du 4^{ème} ventricule, les **cordons postérieurs**, qui paraissent faire suite à ceux de la moelle, s'écartent l'un de l'autre et se continuent par les **pédoncules cérébelleux inférieurs**.
- Entre les deux pédoncules cérébelleux inférieurs, la face postérieure du bulbe est uniquement constituée par une membrane épithéliale, **la membrana tectoria**, doublée par **la toile choroïdienne inférieure**, et traversée par le **trou de Magendie**.
- Cet orifice met en communication la cavité ventriculaire avec les espaces sous-arachnoïdiens .

suite

- Au niveau de la moelle allongée : On retrouve, au tiers inférieur, la prolongation des cordons dorsaux de la moelle épinière.
- La partie haute de cette région comporte un relief, **le corps restiforme**, et les reliefs des **noyaux gracile et cunéiforme**.
- Puis les deux cordons dorsaux de la moelle allongée s'écartent l'un de l'autre pour délimiter **la cavité du 4ème ventricule** et constituer **les pédoncules cérébelleux inférieurs**.

2-le pont (protubérance annulaire)

- **Face antérieure:** Au niveau du pont les fibres nerveuses constituent un bourrelet transversal dont les extrémités latéro - dorsales forment *les pédoncules cérébelleux moyens*.
- Le sillon horizontal qui sépare la moelle allongée et le pont s'appelle *sillon bulbo-pontique*.
- A ce niveau apparaissent plusieurs nerfs crâniens

suite

- la face postérieure du pont est occupée par la très large cavité losangique du **4ème ventricule**, qui communique, en haut, avec le **3ème ventricule** par un pertuis étroit appelé **aqueduc du mésencéphale** (a. de Sylvius).
- La partie haute et la partie basse du 4ème ventricule sont recouvertes par des replis du tissu nerveux appelés **valvule de VIEUSSENS** en haut, **valvule de TARIN** en bas. Cette dernière possède un orifice **appelé trou de MAGENDIE**. Le fond de la cavité du 4ème ventricule constitue **le plancher du 4ème ventricule** et comporte plusieurs reliefs qui correspondent aux noyaux des nerfs crâniens.
- Au niveau des angles latéraux du 4ème ventricule se trouvent **les plexus choroïdes**, à structure glomérulaire et responsables de la sécrétion du liquide cérébro-spinal, à ce niveau.

le plancher du 4^{ème} ventricule


- il présente, de chaque côté d'un sillon médian appelé **tige du calamus**:
- **en bas**, dans la partie bulbaire du ventricule, **l'aile blanche interne**, **l'aile grise ou fovea inferior**, et **l'aile blanche externe** ou partie inférieure de **l'aire vestibulaire**;
- **en haut**, dans la partie protubérantielle, **l'eminencia teres**, **la fovea superior** et la partie supérieure de **l'aire vestibulaire**.
- De part et d'autre du 4^e ventricule, s'étend la surface de section d

suite

- De part et d'autre du 4^{ème} ventricule, s'étend la surface de section des pédoncules cérébelleux inférieur, moyen et supérieur.
- Ces pédoncules vont: le premier au bulbe, le deuxième à la protubérance, le troisième au mésencéphale.
- Le 4^{ème} ventricule s'élève jusqu'à la limite supérieure de la protubérance, en sorte que la face postérieure du mésencéphale succède au 4^e ventricule

Face Postérieure

1. colliculus supérieur (tubercules quadrijumeaux antérieurs)
2. colliculus inférieur (tubercules quadrijumeaux postérieurs)
3. bras conjonctivaux antérieurs
4. bras conjonctivaux postérieurs
5. sillon cruciforme
6. IV - nerf pathétique
7. voile épendymaire supérieur (valvule de Vieussens)
8. pédoncule cérébelleux supérieur
9. pédoncule cérébelleux moyen
10. pédoncule cérébelleux inférieur (corps restiforme)
11. IVe ventricule
12. voile épendymaire inférieur (valvule de Tarin)
13. trou de Luschka
14. trou de Magendie
15. sillon médian dorsal
16. renflement des noyaux gracieux et cunéiformes (noyaux de Goll et Burdach)



2-Le sillon bulbo-protubérantiel

- sépare le bulbe de la protubérance. Quatre nerfs sortent de ce sillon; ce sont, de dedans en dehors:
- le moteur oculaire externe(VI),
- le facial (VII)
- l'intermédiaire de Wrisberg (VII bis) et
- l'auditif (VIII) .
- Le moteur oculaire externe sort au-dessus de la pyramide antérieure; les autres émergent des parties latérales du sillon.
- Les racines du trijumeau(V) émergent de la protubérance à la jonction de la face antérieure de la protubérance avec ses faces latérales.

3- Les pédoncules cérébraux

- montent en divergeant au-dessus de la protubérance.
- Ils sont séparés l'un de l'autre par l'espace perforé postérieur.
- Celui-ci s'étend en avant jusqu'aux tubercules mamillaires.
- Les nerfs moteurs oculaires communs (IV) sortent du névraxe le long du bord interne des pédoncules cérébraux.
- Le sillon latéral sépare ceux-ci des pédoncules cérébelleux supérieurs et des tubercules quadrijumeaux.
- Les pédoncules cérébraux disparaissent en haut, dans la partie inférieure du cerveau, quand ils sont contournés par les bandelettes optiques.

4-le mésencéphale


- Sa face postérieure est occupée par **les tubercules quadrijumeaux antérieurs et postérieurs**.
- **Le nerf pathétique (IV)** émerge de chaque côté **du frein de la valvule de Vieussens**, placé à l'extrémité inférieure du sillon médian qui sépare les tubercules quadrijumeaux droits et gauches.
- Les tubercules quadrijumeaux sont reliés de chaque côté, aux **corps genouillés externe et interne** qui sont en relief sur l'extrémité postérieure des couches optiques, par des cordons nerveux, en relief, eux aussi, sur les couches optiques et appelés bras conjonctivaux antérieur et postérieur

suite

- Les connexions des tubercules quadrijumeaux avec les corps genouillés externe et interne sont résumées dans la **formule AEPI**.
- On a déjà vu plus haut que le mésencéphale est traversé de bas en haut par l'aqueduc de Sylvius. Cette partie des cavités épendymaires relie le 4^{ème} ventricule au 3^{ème}.

suite

- Au niveau de la face dorsale du mésencéphale il existe un segment étroit appelé *Toit du Mésencéphale* (ou lame quadrijumelle) qui comporte les 4 reliefs des tubercules quadrijumeaux sus-citées, actuellement appelés *colliculus supérieur et colliculus inférieur*, qui sont des centres sensoriels réflexes pour la vision et l'audition.







FIG. 211. — Tronc cérébral; face antérieure.

Tronc cérébral; face latérale









FIG. 213. — Tronc cérébral; face postérieure.




(c) Vue postérieure



Les nerfs crâniens ont leur d'origine dans le tronc cérébral à l'exception des nerfs olfactif et optique.





configuration interne

La substance grise


- La substance grise subit à ce niveau d'importantes modifications qui résultent en partie de la disposition de la vaste cavité du 4ème ventricule.
- De plus, la substance grise se fragmente en nombreux noyaux étagés, disposés sous le plancher du 4ème ventricule.
- Elle perd ainsi la disposition en papillon qu'elle avait au niveau de la moelle épinière.
- Les noyaux de substance grise peuvent être subdivisés en deux groupes :
- a) - les noyaux ou centres segmentaires. Ce sont les noyaux d'origine des nerfs craniens. Ils sont placés sous le plancher du 4ème ventricule.
- b) - les noyaux ou centres supra-segmentaires. Ce sont des noyaux gris plus volumineux qui constituent, pour la plupart, des relais sur les voies motrices extra-pyramidales. Les autres sont des relais sensitifs ou sensoriels.

suite

- Ces noyaux sont de haut en bas :
- **le noyau rouge** qui est lui-même formé de deux parties appelées **néorubrum** et **paléorubrum**.
- **les noyaux du toit du mésencéphale** dont le volume constitue le relief **des colliculus supérieur et inférieur** (tubercules quadrijumeaux)
- **Noyau olivaire de la moelle allongée**
- **Le noyau vestibulaire** qui est placé dans les angles latéraux de la cavité du 4ème ventricule.
- **Les noyaux cunéiformes et graciles**, premier relais des voies sensitives **du système lemniscal**
- **La substance réticulée** (ou Substance réticulaire)

La substance réticulée


- Il s'agit d'une très longue bande de substance grise, disposée profondément en trois colonnes (médiane et para - médianes ou latérales), selon l'axe vertical du tronc cérébral.
- Elle est formée de nombreux petits neurones connectés entre eux réalisant un réseau plexiforme, d'où le nom de substance réticulée.
- Elle contient plusieurs noyaux particuliers, en situation médiane et para-médiane, dans la moelle allongée, le pont et le mésencéphale.
On distingue ainsi :
 - au niveau **de la moelle allongée** : les noyaux du raphé médians et para-médians et les noyaux giganto-cellulaires (ou magno - cellulaires).
 - au niveau **du pont** : la continuation des noyaux du raphé
 - au niveau du mésencéphale : **la substance grise péri-aqueducale**.
- Ces derniers noyaux sont impliqués dans la neurophysiologie de la douleur.



La substance blanche

- Elle constitue le corps du tronc cérébral. A ce niveau on retrouve les faisceaux ascendants sensitifs et les faisceaux descendants moteurs déjà étudiés au niveau de la moelle.
- Elle contient, en plus, *le faisceau longitudinal médial* (anciennement bandelette longitudinale postérieure), qui constitue des voies d'association entre les noyaux des nerfs crâniens oculo-moteurs (III, IV, VI) et les noyaux du V, du VII et du XI.
- Elle reçoit de nombreuses collatérales du noyau vestibulaire et elle se prolonge en bas dans le faisceau vestibulo-spinal.
- Ce dispositif explique les relations physiologiques entre les troubles de l'équilibre et le nystagmus (mouvements automatiques et saccadés des globes oculaires).

[S.77] Tronc cérébral : Morphologie interne (coupe vertico - sagittale)
 Noyaux segmentaires et supra-segmentaires
 de la substance grise du Tronc cérébral




- a : Péduncule cérébral. b : Noyau rouge. c : Aqueduc du Mésencéphale.
 d : Pont e : Substance Réticulée. f : Olive de la moelle allongée.
 g : Noyaux segmentaires (noyaux des nerfs crâniens). h : Noyau Gracile .
 i : Noyau Cunéiforme. j : plancher du 4ème ventricule.
 k : Noyau Vestibulaire (représenté en grisé, car il n'est pas placé dans le plan
 de coupe, mais dans les angles latéraux du 4ème ventricule).
 l : toit du 4ème ventricule. m : cavité du 4ème ventricule. n : Colliculus inférieur
 o : Colliculus supérieur.

Vascularisation

- La vascularisation du tronc cérébral est assurée par différentes artères :
- Pour la moelle allongée :
 - L'artère spinale antérieure, pour la région ventrale,
 - Les artères vertébrales, pour les régions latérales,
 - Les artères cérébelleuses postérieures inférieures, pour les régions dorsales.

suite

- Pour le pont, la vascularisation se fait essentiellement par des vaisseaux issus de l'artère basilaire (formée par la réunion des artères vertébrales) :
- Les artères pontines,
- Les artères cérébelleuses inféro-antérieures et supérieures
- Pour le mésencéphale : Les artères paramédianes, issues de la bifurcation de l'artère basilaire, pour les régions ventrales,
- Les artères circonférentielles courtes, issues de l'artère cérébrale postérieure, pour les régions latérales,
- Les artères circonférentielles longues, issues de l'artère cérébelleuse supérieure et de l'artère cérébrale postérieure, pour les régions dorsales



Vascularisation du tronc cérébral :

7– artère basilaire

8– artères cérébelleuses supérieures

9– artères pontines

10– artères vertébrales

11– artères cérébelleuses inféro-
antérieures

12– artères cérébelleuses inféro-
postérieures

13– artère spinale antérieure